

108 Alimoche común



Alimoche común. Adulto (14-III).

ALIMOCHES COMÚN (*Neophron percnopterus*)

IDENTIFICACIÓN

58-70 cm. **Adultos** de color blanco, excepto las plumas del ala; cabeza y garganta sin plumas, de color amarillo. **Juveniles** de color pardo oscuro uniforme.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje y tamaño similar.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial, no cambiando anualmente todas las plumas de vuelo; el periodo de muda comienza después de la cría, para detenerse antes de la migración y terminar en las áreas de invernada. La muda **postjuvenil** comienza en su **2º año**, reteniendo algunas plumas de vuelo que son cambiadas en su **3º año**; el periodo de muda discurre desde marzo hasta noviembre.

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, repartida por toda la Comunidad en paisajes abiertos siempre que haya suficiente alimento y cortados para nidificar.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 5 tipos de edad:

Juvenil con plumas de ala y cola de la misma edad; plumaje marrón oscuro; coberteras del ala con punta pálida; cola marrón con la punta clara; plumas del collar de color similar a las corporales; piel de la cara azulada.

2º año otoño/3º año primavera parecido al **juvenil**, pero con dos generaciones de plumas de vuelo; plumas corporales moteadas de gris-marrón; plumas del collar más oscuras que las vecinas; partes inferiores con contraste entre los flancos oscuros y el vientre más claro; piel de la cara como en **juveniles**, pero la base del pico es amarillenta.

3º año otoño/4º año primavera con plumas blancas apareciendo en las partes inferiores o infracoberteras del ala; plumas del collar con abundantes plumas blancas; cola gris-ante, con bordes pálidos; piel de la cara amarillenta.

4º año otoño/5º año primavera similar al **adulto** pero con plumas grises y marrones en las infracoberteras del ala; plumas de la cola con mezcla de plumas blancas y grisáceas; algunas plumas marrones entre las corporales y coberteras del ala.

Adulto con plumaje corporal blanco, más o menos sucio; grandes coberteras internas y primarias negras; collar con todas las plumas blancas; piel de la cara amarilla; patas rosadas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



Alimoche común. 4º año otoño ().

108 Alimoche común



Alimoche común. 3º año otoño (10-IX).



Alimoche común. Adulto: diseño de la cabeza (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de la cabeza ().



Alimoche común. 2º año otoño (26-VII).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de la cabeza (10-IX).



Alimoche común. Juvenil (01-XI).




Alimoche común. 2º año otoño: diseño de la cabeza (26-VII).





Alimoche común. Juvenil: diseño de la cabeza (01-XI).


108 Alimoche común




Alimoche común. Diseño del capirote: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño ().



Alimoche común. Diseño del pecho: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).




Alimoche común. Diseño del capirote: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).




Alimoche común. Diseño del dorso: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño ().

Alimoche común. Diseño del pecho: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño ().


108 Alimoche común




Alimoche común. Diseño de la cola: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño del capirote: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).




Alimoche común. Diseño de las patas. De arriba hacia abajo: adulto (14-III); 4º año otoño (); 3º año otoño (10-IX); 2º año otoño (26-VII); juvenil (01-XI).





Alimoche común. Diseño de la cola: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño ().

108 Alimoche común




Alimoche común. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (14-III); abajo 4º año otoño ().



Alimoche común. Diseño de terciarias: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño ().



Alimoche común. Diseño de coberteras primarias: arriba 3º año otoño (10-IX); centro 2º año otoño (26-VII); abajo juvenil (01-XI).




Alimoche común. Diseño de terciarias: arriba izquierda 3º año otoño (10-IX); arriba derecha 2º año otoño (26-VII); izquierda juvenil (01-XI).

108 Alimoche común



Alimoche común. Adulto: diseño de infracoberteras del ala (14-III).




Alimoche común. 4º año otoño: diseño de infracoberteras del ala ().





Alimoche común. Adulto: diseño de primarias (14-III).

Alimoche común. 3º año otoño: diseño de infracoberteras del ala (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de infracoberteras del ala (26-VII).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de primarias ().


Alimoche común. Juvenil: diseño de infracoberteras del ala (01-XI).

108 Alimoche común



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de primarias (10-IX).



Alimoche común. Juvenil: diseño de primarias (01-XI).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de primarias (26-VII).

Alimoche común. Adulto: diseño de secundarias (14-III).

108 Alimoche común



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de secundarias ().



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de secundarias (26-VII).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de secundarias (10-IX).




Alimoche común. Juvenil: diseño de secundarias (01-XI).



108 Alimoche común



Alimoche común. Adulto: diseño del ala (14-III).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño del ala (26-VII).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño del ala ().



Alimoche común. Juvenil: diseño del ala (01-XI).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño del ala (10-IX).