378 Mosquitero papialbo





Mosquitero papialbo. Primavera (13-IV).

MOSQUITERO PAPIALBO

(Phylloscopus bonelli)

IDENTIFICACIÓN

10-11 cm. Partes superiores pardo-gris, con tonos verdoso; partes inferiores blancas; obispillo y bordes de coberteras y plumas del ala de color amarillo-verdoso; ceja blanca; patas pardas.

ESPECIES SIMILARES

Las partes inferiores blanco puro lo hacen fácil de separar de los otros mosquiteros como el **mosquitero ibérico** y el **mosquitero común**, que tienen patas oscuras y emarginada hasta la 5ª primaria. El **mosquitero musical** tiene patas claras, pero es más amarillo y sin contraste entre el obispillo amarillo y el dorso. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.



Zarcero común

Mosquitero ibérico

SEXC

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con el plumaje nuevo; obispillo amarillento con poco contraste con la espalda. Adultos con las plumas de la cola y el ala (excepto alguna terciaria mudada) desgastadas; obispillo amarillo con marcado contraste con la espalda.

En primavera, después de la muda **posnup- cial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría que incluye plumas del cuerpo y terciarias. La muda **postjuvenil** abarca sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada africanas, siendo después indistinguibles por el plumaje.

FENOLOGÍA



ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival común en todos los bosques montanos de la Comunidad, faltando sólo en las áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.



Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto (06-VII).

378 Mosquitero papialbo





Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil (10-VIII).











Mosquitero papialbo. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (22-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño de la cabeza: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (06-VII); izquierda juvenil (10-VIII).











Mosquitero papialbo. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).

Mosquitero papialbo. Otoño. Diseño del obispillo: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (10-VIII).

378 Mosquitero papialbo









Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto: diseño del ala (07-VII).



Mosquitero papialbo. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil: diseño del ala (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Primavera: diseño del ala (13-IV).