

اختبارات فحص السرطان الموصى بها

مسرد

50+ سنة

40 إلى 49 سنة

25 إلى 39 سنة

<p>فحص سرطان القولون والمستقيم</p> <p>يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم أو العثور عليه مبكرًا عندما يكون من الأسهل علاجه، يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم عن طريق العثور على ورم سرطاني وإزالته قبل أن يصبح سرطاناً.</p>	<p>فحوصات سرطان القولون والمستقيم</p> <p>ابداً الشخص المنتظم في سن 45، واستمر حتى سن 75. بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 76 و 85 عاماً، يجب أن يعتمد قرار الفحص على تقضياتهم ومتوسط العمر المتوقع والصحة العامة وتاريخ الفحص السابق.</p> <p>يمكن استخدام عدة أنواع من الاختبارات. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول الاختبارات الأفضل لك.</p> <p>بغض النظر عن الاختبار الذي تختره، فإن أهم شيء هو الخصوص للفحص.</p>	<p>فحوصات سرطان القولون والمستقيم</p> <p>اكتشف ما إذا كنت معرضاً لخطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا حاجة للفحص في هذا الوقت.</p>
<p>فحص سرطان البروستاتا</p> <p>قد تكون مستويات مستضد البروستاتا المنوعي في الدم أعلى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى حالات أخرى. مع فحص المستقيم الرقمي، يُقْرَأ مقدمة الرعاية الصحية بفحص البروستاتا بغضّ عن كتل أو حجم غير طبيعي.</p>	<p>فحص سرطان البروستاتا</p> <p>في سن الخمسين، يجب على الرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا ومن المتوقع أن يعيشوا 10 سنوات أخرى على الأقل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول المخاطر والفوائد المحتملة للفحص لاتخاذ قرار ما إذا كان الشخص مناسبًا لهم. إذا قرروا الخضوع للفحص، فيجب أن يخضعوا لفحص مستضد البروستاتا المنوعي (PSA) مع أو بدون فحص المستقيم الرقمي. يجب عليهم التحدث إلى طبيبهم حول عدد المرات التي سيحضرون فيها الفحص.</p>	<p>فحص سرطان البروستاتا</p> <p>عاماً، على الرجال المعرضين لخطر كبير، وجميع الرجال السود، والرجال الذين لديهم أفراد مقربون من العائلة أصيبوا بسرطان البروستاتا قبل سن 65 عاماً منافقة المخاطر والفوائد المحتملة للفحص مع مقدم الرعاية الصحية. يجب على الرجال المعرضين لخطر أكبر (أولئك الذين لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان البروستاتا قبل سن 65) خوض هذه المناقشة مع مقدم الرعاية الصحية بدءاً من سن 40. يجب عليهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخضوع لفحص مستضد البروستاتا المنوعي (PSA) مع أو بدون فحص المستقيم الرقمي.</p>
<p>تصوير الثدي بالأشعة السينية</p> <p>تصوير الثدي بالأشعة السينية هو فحص بالأشعة السينية للثدي يستخدم للمساعدة في البحث عن علامات سرطان الثدي لدى النساء اللواتي ليس لديهن أي أعراض أو مشكلات في الثدي.</p>	<p>تصوير الثدي</p> <p>الحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام بين سن 45 و 54؛ ثم في سن 55، يمكنك التحول إلى تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عامين، أو مواصلة الفحص السنوي. يجب أن يستمر الفحص طالما أنه يصحى جيداً ومن المتوقع أن تعيشى 10 سنوات أخرى على الأقل.</p>	<p>فحوصات سرطان الثدي</p> <p>اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 44 عاماً خيار بده فحص سرطان الثدي بتصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام إذا رغبن في ذلك. بدءاً من سن 45، يجب أن يخضعن للتصوير الشعاعي للثدي كل عام.</p>
<p>اختبار باب (Pap)</p> <p>يتحقق اختبار باب (Pap) من تغيرات الخلايا أو الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم.</p> <p>اختبار فيروس الورم الحليمي البشري</p> <p>يتحقق اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من الفيروسات ويمكن إجراؤه في نفس وقت اختبار عنق الرحم (باب) (Pap)).</p> <p>اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الأساسي</p> <p>هو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الذي يتم إجراؤه للفحص</p> <p>الاختبار المشترك</p> <p>هو الاختبار باستخدام اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (باب) ((Pap))</p>	<p>فحوصات سرطان الرحم</p> <p>يجب أن تخضع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 65 عاماً ولديهن عنق رحم لاختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الأساسي كل 5 سنوات. إذا لم يكن اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الأساسي متاحاً، فقومي بإجراء اختبار مشترك كل 5 سنوات أو اختبار عنق الرحم وحده كل 3 سنوات.</p> <p>لا ينبغي فحص النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 66 عاماً أو أكثر من خضعن لفحص منتظم لسرطان الرحم في السنوات العشر الماضية وكانت النتائج طبيعية.</p> <p>يجب فحص النساء اللاتي عانين من سرطان عنق الرحم الخطير، لمدة 25 عاماً على الأقل بعد ذلك التشخيص حتى لو استمر الفحص بعد سن 65 عاماً.</p> <p>يجب على النساء اللاتي تمت إزالة عنق الرحم والرحم لديهن عن طريق الجراحة التوقف عن الفحص ما لم تكن الجراحة قد تمت لعلاج سرطان عنق الرحم أو لعلاج حالة خطيرة متحتملة التسرطن.</p> <p>يجب على النساء اللاتي تم تطعيمهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري اتباع توصيات الفحص لفتيانهن العربية.</p>	
<p>اختبار سرطان الرئة</p> <p>الأشخاص الذين يدخنون أو اعتادوا على التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.</p> <p>تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول خطر إصابة بسرطان الرئة، والفوائد والمددات والأضرار المحتملة للفحص المبكر لسرطان الرئة.</p>	<p>فحص الكشف عن سرطان الرئة</p> <p>إذا كنت تدخن حالياً أو اعتدت على التدخين، وتبلغ من العمر 50 إلى 80 عاماً، ومنهم هم في خطر كبير للإصابة بسرطان الرئة بسبب تاريخ تدخين السجائر البالغ 20 على أو أكثر في السنة، فقد تحتاج إلى فحص سرطان الرئة سنويًا باستخدام التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة.</p>	

يغطي التأمين عادة خدمات الوقاية والفحص. يرجى التحقق لتأكيد مزايا الرعاية الصحية المحددة الخاصة بك. إذا لم يكن لديك تأمين أو لا يمكنك تحمل تكاليف الفحص، فقم بزيارة cancer.org/getscreened لمزيد من المعلومات.



تأكد من إخبار طبيبك أو ممرضتك إذا كان لديك أي نوع من السرطان أو إذا كانت والدتك أو والدك أو أخوك أو أختك أو أطفالك قد أصيبوا بالسرطان.

قد تحتاج إلى البدء في فحص بعض أنواع السرطان في وقت مبكر أو الخصوص للفحص في كثير من الأحيان إذا كان لديك عوامل خطر معينة. تحدث إلى طبيبك اليوم