


試行事業における実地研修の  
実施回別・STEP別の達成状況  
(特定の者対象)

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(口腔内)」

実地研修:「たんの吸引・口腔内」の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。 イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。 ウ. 手順について抜かした
-----	---

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目	19回目	20回目	
準備	手を洗う。	100.0%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	利用者本人に体調を聞く。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	利用者本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。口の周囲、口腔内を観察する。	88.2%	93.3%	92.3%	92.3%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	88.2%	93.3%	92.3%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	82.4%	93.3%	92.3%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	82.4%	93.3%	92.3%	92.3%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	76.5%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	吸引カテーテルを口腔内に入れる。	64.7%	86.7%	76.9%	76.9%	87.5%	87.5%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をティッシュで拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	82.4%	93.3%	92.3%	92.3%	75.0%	87.5%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	76.5%	80.0%	84.6%	84.6%	87.5%	87.5%	85.7%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	94.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	後片付けを行う。	70.6%	80.0%	84.6%	84.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える	82.4%	86.7%	84.6%	84.6%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑫	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(口腔内)」

実地研修:「たんの吸引・口腔内」の指導者評価


回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目	19回目	20回目
準備	手を洗う。	17/17	14/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	医師・訪問看護の指示を確認する。	17/17	15/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	利用者本人に体調を聞く。	17/17	15/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
①	利用者本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。口の周囲、口腔内を観察する。	15/17	14/15	12/13	10/11	7/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	15/17	14/15	12/13	10/10	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	14/17	14/15	12/13	10/10	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	14/17	14/15	12/13	10/10	7/8	7/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑤	「吸いますよ～」と声をかける。	13/17	14/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑥	吸引カテーテルを口腔内に入れる。	11/17	13/14	10/13	11/11	7/8	7/8	6/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をティッシュで拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	14/17	14/15	12/13	9/10	6/8	7/8	6/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	13/17	12/15	11/13	10/10	7/8	7/8	6/7	2/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	16/17	15/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑩	後片付けを行う。	12/17	12/15	11/13	10/10	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える	14/17	13/15	11/13	9/10	7/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑫	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	17/17	15/15	13/13	11/11	8/8	8/8	7/7	3/3	3/3	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(鼻腔内)」

## 実地研修:【鼻腔内吸引】の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。 イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。 ウ. 手順について抜かした
-----	---

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
準備	手を洗う。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	本人に体調を聞く。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、意思を確認する。	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	70.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	80.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	70.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	吸引カテーテルを鼻腔内に入れる。	80.0%	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	70.0%	100.0%	90.0%	90.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	後片付けを行う。	70.0%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える。	80.0%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑫	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(鼻腔内)」

## 実地研修:【鼻腔内吸引】の指導者評価

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
準備	手を洗う。	10/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
	医師・訪問看護の指示を確認する。	10/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
	本人に体調を聞く。	10/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
①	本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、意思を確認する。	9/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	8/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	7/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	8/10	9/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	7/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑥	吸引カテーテルを鼻腔内に入れる。	8/10	10/10	9/10	8/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	7/10	10/10	9/10	7/9	4/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	8/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	8/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑩	後片付けを行う。	7/10	9/10	9/10	8/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える。	8/10	9/10	9/10	8/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1
⑫	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	10/10	10/10	10/10	9/9	6/6	6/6	5/5	1/1	1/1	1/1

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(気管カニューレ内部)」

実地研修:「たんの吸引・カニューレ内部」の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。 イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。 ウ. 手順について抜かした
-----	---

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目	19回目
準備	手を洗う。	100.0%	100.0%	100.0%	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	利用者本人に体調を聞く。	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	利用者本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	95.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	85.0%	90.0%	95.0%	94.7%	93.8%	93.3%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	65.0%	75.0%	85.0%	89.5%	93.8%	93.3%	92.3%	91.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	70.0%	90.0%	90.0%	94.7%	93.8%	93.3%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	85.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	フレックスチューブのコネクターをはずす。	60.0%	85.0%	85.0%	94.7%	93.8%	93.3%	84.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	滅菌手袋をつけた手(またはセクション)で吸引カテーテルを気管カニューレ内(約10cm)に入れる。	75.0%	80.0%	95.0%	94.7%	93.8%	100.0%	84.6%	100.0%	100.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	カテーテルを回しながら吸引をし、終了したらすぐにコネクターのふたをさする。	75.0%	85.0%	85.0%	89.5%	87.5%	93.3%	84.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	65.0%	75.0%	85.0%	94.7%	87.5%	86.7%	76.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	65.0%	75.0%	70.0%	73.7%	87.5%	86.7%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑫	気道内圧がいつもの数値に上昇しているかを確認する。	55.0%	80.0%	85.0%	89.5%	93.8%	86.7%	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑬	後片付けを行う。	85.0%	85.0%	90.0%	89.5%	87.5%	93.3%	92.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑭	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える	80.0%	85.0%	90.0%	89.5%	93.8%	93.3%	92.3%	91.7%	91.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑮	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	95.0%	95.0%	95.0%	89.5%	93.8%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 介護職全体に占める「ア」の割合が100%
- 介護職全体に占める「ア」の割合が80%以上100%未満
- 介護職全体に占める「ア」の割合が80%以下

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「たんの吸引(気管カニューレ内部)」

実地研修:「たんの吸引・カニューレ内部」の指導者評価


回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目	19回目	
準備	手を洗う。	20/20	20/20	20/20	18/19	16/16	15/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
	医師・訪問看護の指示を確認する。	20/20	20/20	20/20	19/19	16/16	15/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
	利用者本人に体調を聞く。	20/20	20/20	20/20	19/19	16/16	15/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
①	利用者本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	19/20	18/20	20/20	19/19	16/16	15/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	17/20	18/20	19/20	18/19	15/16	14/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	13/20	15/20	17/20	17/19	15/16	14/15	13/13	11/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	14/20	18/20	18/20	18/19	15/16	14/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	17/20	20/20	20/20	19/19	16/16	15/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑥	フレックステューブのコネクターをはずす。	12/20	17/20	17/20	18/19	15/16	14/15	11/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑦	滅菌手袋をつけた手(またはセッシン)で吸引カテーテルを気管カニューレ内(約10cm)に入れる。	15/20	16/20	19/20	18/19	15/16	15/15	11/13	12/12	12/12	9/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑧	カテーテルを回しながら吸引をし、終了したらすぐにコネクターのふたをずらす。	15/20	17/20	17/20	17/19	14/16	14/15	11/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑨	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	13/20	15/20	17/20	18/19	14/16	13/15	10/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑩	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	20/20	15/20	14/20	14/19	14/16	13/15	11/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑪	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	19/20	20/20	20/20	19/19	16/16	15/15	13/13	12/12	11/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑫	気道内圧がいつもの数値に上昇しているかを確認する。	11/20	16/20	17/20	17/19	15/16	13/15	13/13	11/12	11/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑬	後片付けを行う。	17/20	17/20	18/20	17/19	14/16	14/15	11/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑭	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える	16/20	17/20	18/20	17/19	15/16	14/15	11/13	11/12	11/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
⑮	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	19/20	18/20	18/20	17/19	14/16	13/15	13/13	12/12	12/12	10/10	7/7	4/4	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(胃ろう・滴下)」

## 実地研修:【胃ろう(滴下)】の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。 イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。 ウ. 手順について抜かした
-----	---

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目
準備	手を洗う。	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	本人に体調を聞く。	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、意思を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	75.0%	87.5%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	75.0%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	75.0%	87.5%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	50.0%	62.5%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	吸引カテーテルを鼻腔内に入れる。	87.5%	62.5%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	62.5%	62.5%	87.5%	87.5%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	62.5%	87.5%	75.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	後片付けを行う。	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%





# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(胃ろう・滴下)」

## 実地研修:【胃ろう(滴下)】の指導者評価


回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目
準備	手を洗う。	7/8	7/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
	医師・訪問看護の指示を確認する。	8/8	8/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
	本人に体調を聞く。	7/8	7/8	7/8	7/8	4/5	2/2	2/2	1/1
①	本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、意思を確認する。	8/8	8/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
②	吸引カテーテルを接続管につなげる。	6/8	7/8	7/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
③	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出し、吸引器のスイッチを入れる。	6/8	7/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
④	消毒液に浸かっている場合の吸引カテーテルは水を吸って外側を洗い流す。	6/8	7/8	7/8	7/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑤	「吸引しますよ～」と声をかける。	4/8	5/8	7/8	7/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑥	吸引カテーテルを鼻腔内に入れる。	7/8	5/8	7/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑦	使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流す。(カテーテルをはずし所定の容器に戻す。)	5/8	5/8	7/8	7/8	4/5	2/2	2/2	1/1
⑧	利用者に吸引が終わったことを告げ、たんがとれたかを確認する。	5/8	7/8	6/8	7/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑨	吸引器のスイッチを切る。(吸引終了)	7/8	7/8	7/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑩	後片付けを行う。	7/8	8/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1
⑪	薬液びんの液の残りが少なければ取り換える。	8/8	8/8	8/8	8/8	5/5	2/2	2/2	1/1

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(胃ろう・半固形)」

## 実地研修:【胃ろう(半固形タイプ)】の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。
	イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。
	ウ. 手順について抜かした

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目
準備	手を洗う。	71.4%	85.7%	85.7%	85.7%	83.3%	83.3%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	利用者本人に体調を聞く。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	利用者本人から注入の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	必要物品を確認する。	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	体位を調整する。	85.7%	85.7%	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	栄養剤を用意する。	71.4%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	胃ろうチューブの破損や抜けがないか確認する。	71.4%	57.1%	71.4%	71.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	胃ろうにシリンジをつなぐ。	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	83.3%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	シリンジの内筒を適切な圧で押しながら注入する。	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	異常がないか、確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯をシリンジで流す。	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	後片付けを行う。	100.0%	71.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(胃ろう・半固形)」

実地研修:【胃ろう(半固形タイプ)】の指導者評価

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目
準備	手を洗う。	5/7	6/7	6/7	6/7	5/6	5/6	4/5	4/5	4/5	4/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
	医師・訪問看護の指示を確認する。	7/7	7/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
	利用者本人に体調を聞く。	7/7	7/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
①	利用者本人から注入の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	6/7	7/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
②	必要物品を確認する。	6/7	6/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
③	体位を調整する。	6/7	6/7	6/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
④	栄養剤を用意する。	5/7	6/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑤	胃ろうチューブの破損や抜けがないか確認する。	5/7	4/7	5/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑥	胃ろうにシリンジをつなぐ。	6/7	6/7	7/7	7/7	6/6	5/6	4/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑦	シリンジの内筒を適切な圧で押しながら注入する。	7/7	6/7	7/7	6/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑧	異常がないか、確認する。	7/7	7/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑨	終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯をシリンジで流す。	6/7	7/7	7/7	6/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑩	後片付けを行う。	7/7	5/7	7/7	7/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1
⑪	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	7/7	7/7	7/7	6/7	6/6	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	2/2	1/1	1/1	1/1

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(経鼻)」

## 実地研修:【経鼻経管栄養】の指導者評価

達成度	ア. 手引きの手順通りに実施できている。 イ. 留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた。 ウ. 手順について抜かした
-----	---

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目
準備	手を洗う。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	医師・訪問看護の指示を確認する。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	利用者本人に体調を聞く。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
①	利用者本人から注入の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
②	必要物品を確認する。	71.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
③	体位を調整する。	71.4%	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
④	注入内容を確認し、栄養剤を用意し注入容器に入れる。滴下筒には半分位満たし滴下が確認できるようにする。	42.9%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%
⑤	チューブの破損や抜けがないか、固定の位置を確認する。口の中でチューブが巻いてないか確認する。	71.4%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥	経鼻カテーテルに、栄養剤のカテーテルをつなぐ。	57.1%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑦	ストッパー(クレンメ)をゆっくり緩めて滴下する。	57.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑧	顔色やサチュレーションモニタの値に異常がないか、確認する。	71.4%	71.4%	85.7%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑨	終わったら、チューブに白湯を流す。	57.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑩	後片付けを行う。	57.1%	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑪	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



介護職全体に占める「ア」の割合が100%



介護職全体に占める「ア」の割合が80%以上100%未満



介護職全体に占める「ア」の割合が80%以下

# 実地研修の実施回別・STEP別の達成状況 「経管栄養(経鼻)」

## 実地研修:【経鼻経管栄養】の指導者評価

回数		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目
準備	手を洗う。	7/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
	医師・訪問看護の指示を確認する。	7/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
	利用者本人に体調を聞く。	7/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
①	利用者本人から注入の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	6/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
②	必要物品を確認する。	5/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
③	体位を調整する。	5/7	6/7	6/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
④	注入内容を確認し、栄養剤を用意し注入容器に入れる。滴下筒には半分位満たし滴下が確認できるようにする。	3/7	7/7	6/7	3/3	3/3	2/3	1/1	1/1	1/1
⑤	チューブの破損や抜けがないか、固定の位置を確認する。口の中でチューブが巻いてないか確認する。	5/7	6/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑥	経鼻カテーテルに、栄養剤のカテーテルをつなぐ。	4/7	6/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑦	ストッパー(クレンメ)をゆっくり緩めて滴下する。	4/7	7/7	7/7	3/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑧	顔色やサチュレーションモニタの値に異常がないか、確認する。	5/7	5/7	6/7	2/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑨	終わったら、チューブに白湯を流す。	4/7	7/7	7/7	2/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑩	後片付けを行う。	4/7	6/7	6/7	2/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1
⑪	評価票に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する。	6/7	7/7	7/7	2/3	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1